

## II. 大腸がん

★は内服薬

2021年6月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1	14日	
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1-2(持続)		
FOLFIRI-2	イリノテカン 塩酸塩水和物	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1	14日	
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1-2(持続)		
Bmab+mFOLFOX6	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	14日	
	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1-2(持続)		
Bmab+FOLFIRI-2	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	14日	
	イリノテカン 塩酸塩水和物	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1-2(持続)		
Cmab単剤	セツキシマブ	初回:400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降:250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1~2時間	day1,8,15,22,29	35日	
Cmab+CPT-11	セツキシマブ	初回:400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降:250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1~2時間	day1,8,15,22, 29,36,43	49日	
	イリノテカン 塩酸塩水和物	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1,15,29		
Cmab+FOLFIRI-2	セツキシマブ	初回:400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降:250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1~2時間	day1,8,15,22, 29,36,43	49日	
	イリノテカン 塩酸塩水和物	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1,15,29		
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1,15,29		
	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	day1,15,29		
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1-2(持続) day15-16(持続)		
IRIS(4週1コース)	イリノテカン 塩酸塩水和物	75~100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1,15	28日	
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1-14		
IRIS(3週1コース)	イリノテカン 塩酸塩水和物	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1	21日	
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1-14		
XELOX(進行・再発)	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1	21日	
	★カベシタピン	2000mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		
XELOX(術後補助)	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1	21日	8コース
	★カベシタピン	2000mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		
Bmab+XELOX	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	
	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	★カベシタピン	2000mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		
Bmab+IRIS	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	
	イリノテカン 塩酸塩水和物	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1		
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1-14		

## II. 大腸がん

★は内服薬

2021年6月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
SOX	オキサリプラチン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1	21日	8コース
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		
Pmab単剤	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注 1時間	day1	14日	
Bmab+XELIRI	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	
	irinotecan 塩酸塩水和物	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1		
	★カペシタビン	1650mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		
Pmab+FOLFIRI-2	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注 1時間	day1	14日	
	irinotecan 塩酸塩水和物	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1-2(持続)		
Pmab+mFOLFOX6	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注 1時間	day1	14日	
	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1-2(持続)		
Bmab+SOX	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	
	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		
MMC+5-FU+Radiation	マイトマイシンC	10mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	day1,29	56日	放射線と併用 1コース
	フルオロウラシル	800mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 23時間	day1-4 day29-32		
sLV5FU2	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1	14日	
	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1-2(持続)		
Pmab+CPT-11	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注 1時間	day1	14日	
	irinotecan 塩酸塩水和物	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1		
ラムシルマブ+FOLFIRI	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注 1時間	day1	14日	
	irinotecan 塩酸塩水和物	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1-2(持続)		
FOLFOXIRI	irinotecan 塩酸塩水和物	165mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1	14日	
	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	フルオロウラシル	3200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1-2(持続)		
Bmab+FOLFOXIRI	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	14日	
	irinotecan 塩酸塩水和物	165mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1		
	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	フルオロウラシル	3200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1-2(持続)		
Bmab+CPT-11	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	14日	
	irinotecan 塩酸塩水和物	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1		
AFL+FOLFIRI-2	アフリベルセプト ペータ	4mg/kg	点滴静注 1時間	day1	14日	
	irinotecan 塩酸塩水和物	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1-2(持続)		

## II. 大腸がん

★は内服薬

2021年6月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
Bmab+I-LV+5-FU	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	14日	
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1-2(持続)		
Bmab+Cape	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	21日	
	★カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		
Bmab+TFTD	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注 30～90分	day1,15	28日	
	★トリフルリジン ・チピラシル塩酸塩	70mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕)-6(朝) day8(夕)-13(朝)		
MMC+Cape+Radiation	マイトマイシンC	10mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	day1,29	56日	放射線と併用 1コース
	★カペシタビン	1650mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	RT施行日 (月～金曜)		
Bmab+UFT/LV	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注 30～90分	day1,15	28日	テガフル・ウ ラシルとホリ ナートは午前・ 午後・夜間の 空腹時に服用
	★テガフル ウラシル	テガフルとして 300mg/m <sup>2</sup> /day	1日3回 8時間毎に	day1(午後)-22(午前)		
	★ホリナート	75mg/body/day	1日3回 8時間毎に	day1(午後)-22(午前)		
Cmab+Encorafenib +Binimetinib	セツキシマブ	初回:400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降:250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1～2時間	day1	7日	
	★エンコラフェニブ	300mg/body/day	1日1回	連日		
	★ビニメチニブ	90mg/body/day	1日2回	連日		
Cmab+Encorafenib	セツキシマブ	初回:400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降:250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1～2時間	day1	7日	
	★エンコラフェニブ	300mg/body/day	1日1回	連日		