Ⅱ. 大腸がん

★は内服薬　　2024年12月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注　2時間	day1	14日	
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注　15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注　46時間	day1-2（持続）		
FOLFIRI-2	イリノテカン塩酸塩水和物	150mg/㎡	点滴静注　2時間	day1	14日	
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注　15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注　46時間	day1-2（持続）		
Bmab+mFOLFOX6	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	14日	
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注　15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注　46時間	day1-2（持続）		
Bmab+FOLFIRI-2	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	14日	
	イリノテカン塩酸塩水和物	150mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注　15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注　46時間	day1-2（持続）		
Cmab単剤	セツキシマブ	初回：400mg/㎡ 2回目以降：250mg/㎡	点滴静注 1～2時間	day1,8,15,22,29	35日	
Cmab+CPT-11	セツキシマブ	初回：400mg/㎡ 2回目以降：250mg/㎡	点滴静注 1～2時間	day1,8,15,22,29,36,43	49日	
	イリノテカン塩酸塩水和物	150mg/㎡	点滴静注　90分	day1,15,29		
Cmab+FOLFIRI-2	セツキシマブ	初回：400mg/㎡ 2回目以降：250mg/㎡	点滴静注 1～2時間	day1,8,15,22,29,36,43	49日	
	イリノテカン塩酸塩水和物	150mg/㎡	点滴静注　2時間	day1,15,29		
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注　2時間	day1,15,29		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注　15分	day1,15,29		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注　46時間	day1-2（持続） day15-16（持続） day29-30（持続）		
IRIS（4週1コース）	イリノテカン塩酸塩水和物	75～100mg/㎡	点滴静注　90分	day1,15	28日	
	★テガフール ギメラシル オテラシルカリウム	テガフールとして 80mg/㎡/day	1日2回　朝夕食後	day1-14		
IRIS（3週1コース）	イリノテカン塩酸塩水和物	150mg/㎡	点滴静注　90分	day1	21日	
	★テガフール ギメラシル オテラシルカリウム	テガフールとして 80mg/㎡/day	1日2回　朝夕食後	day1-14		
XELOX（進行・再発）	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注　2時間	day1	21日	
	★カペシタビン	2000mg/㎡/day	1日2回　朝夕食後	day1（夕）-15（朝）		
XELOX（術後補助）	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注　2時間	day1	21日	8コース
	★カペシタビン	2000mg/㎡/day	1日2回　朝夕食後	day1（夕）-15（朝）		
Bmab+XELOX	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	21日	
	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	★カペシタビン	2000mg/㎡/day	1日2回　朝夕食後	day1（夕）-15（朝）		
Bmab+IRIS	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	21日	
	イリノテカン塩酸塩水和物	150mg/㎡	点滴静注　90分	day1		
	★テガフール ギメラシル オテラシルカリウム	テガフールとして 80mg/㎡/day	1日2回　朝夕食後	day1-14		

Ⅱ. 大腸がん

★は内服薬　　2024年12月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
SOX	オキサリプラチン	100mg/㎡	点滴静注　2時間	day1	21日	8コース
	★テガフール ギメラシル オテラシルカリウム	テガフールとして 80mg/㎡/day	1日2回　朝夕食後	day1（夕） -15（朝）		
Pmab単剤	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注　1時間	day1	14日	
Bmab+XELIRI	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	21日	
	イリノテカン 塩酸塩水和物	200mg/㎡	点滴静注　90分	day1		
	★カペシタビン	1650mg/㎡/day	1日2回　朝夕食後	day1（夕） -15（朝）		
Pmab+FOLFIRI-2	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注　1時間	day1	14日	
	イリノテカン 塩酸塩水和物	150mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注　15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注　46時間	day1-2（持続）		
Pmab+mFOLFOX6	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注　1時間	day1	14日	
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注　15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注　46時間	day1-2（持続）		
Bmab+SOX	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	21日	
	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	★テガフール ギメラシル オテラシルカリウム	テガフールとして 80mg/㎡/day	1日2回　朝夕食後	day1（夕） -15（朝）		
MMC+5-FU+Radiation	マイトマイシンC	10mg/㎡	点滴静注　15分	day1,29	56日	放射線と併用 1コース
	フルオロウラシル	800mg/㎡	点滴静注　23時間	day1-4 day29-32		
sLV5FU2	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注　2時間	day1	14日	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注　15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注　46時間	day1-2（持続）		
Pmab+CPT-11	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注　1時間	day1	14日	
	イリノテカン 塩酸塩水和物	150mg/㎡	点滴静注　90分	day1		
ラムシルマブ+FOLFIRI	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注　1時間	day1	14日	
	イリノテカン 塩酸塩水和物	150mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注　15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注　46時間	day1-2（持続）		
FOLFOXIRI	イリノテカン 塩酸塩水和物	165mg/㎡	点滴静注　90分	day1	14日	
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	フルオロウラシル	3200mg/㎡	点滴静注　46時間	day1-2（持続）		
Bmab+FOLFOXIRI	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	14日	
	イリノテカン 塩酸塩水和物	165mg/㎡	点滴静注　90分	day1		
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	フルオロウラシル	3200mg/㎡	点滴静注　46時間	day1-2（持続）		
Bmab+CPT-11	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	14日	
	イリノテカン 塩酸塩水和物	150mg/㎡	点滴静注　90分	day1		
AFL+FOLFIRI-2	アフリベルセプト　ベータ	4mg/kg	点滴静注　1時間	day1	14日	
	イリノテカン 塩酸塩水和物	150mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注　15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注　46時間	day1-2（持続）		

Ⅱ. 大腸がん

★は内服薬　　2024年12月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
Bmab+I-LV+5-FU	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	14日	
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注　15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注　46時間	day1-2（持続）		
Bmab+Cape	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	21日	
	★カペシタビン	2000mg/㎡/day	1日2回　朝夕食後	day1（夕） -15（朝）		
Bmab+TFTD	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注 30～90分	day1,15	28日	
	★トリフルリジン ・チピラシル塩酸塩	70mg/㎡/day	1日2回　朝夕食後	day1（夕）-6（朝） day8（夕）-13（朝）		
MMC+Cape+Radiation	マイトマイシンC	10mg/㎡	点滴静注　15分	day1,29	56日	放射線と併用 1コース
	★カペシタビン	1650mg/㎡/day	1日2回　朝夕食後	RT施行日 （月～金曜）		
Bmab+UFT/LV	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注 30～90分	day1,15	28日	テガフール・ウラシルとホリナートは午前・午後・夜間の空腹時に服用
	★テガフール ウラシル	テガフールとして 300mg/㎡/day	1日3回　8時間毎に	day1（午後）-22（午前）		
	★ホリナート	75mg/body/day	1日3回　8時間毎に	day1（午後）-22（午前）		
Cmab+Encorafenib +Binimetinib	セツキシマブ	初回：400mg/㎡ 2回目以降：250mg/㎡	点滴静注 1～2時間	day1	7日	
	★エンコラフェニブ	300mg/body/day	1日1回	連日		
	★ビニメチニブ	90mg/body/day	1日2回	連日		
Cmab+Encorafenib	セツキシマブ	初回：400mg/㎡ 2回目以降：250mg/㎡	点滴静注 1～2時間	day1	7日	
	★エンコラフェニブ	300mg/body/day	1日1回	連日		
Cmab(biweekly) +ENCO+BINI	セツキシマブ	500mg/㎡	点滴静注　2時間	day1	14日	
	★エンコラフェニブ	300mg/body/day	1日1回	連日		
	★ビニメチニブ	90mg/body/day	1日2回	連日		
Cmab(biweekly)+ENCO	セツキシマブ	500mg/㎡	点滴静注　2時間	day1	14日	
	★エンコラフェニブ	300mg/body/day	1日1回	連日		
Cmab(biweekly)+CPT-11	セツキシマブ	500mg/㎡	点滴静注　2時間	day1	14日	
	イリノテカン 塩酸塩水和物	150mg/㎡	点滴静注　90分	day1		
Cmab(biweekly) +mFOLFOX6	セツキシマブ	500mg/㎡	点滴静注　2時間	day1	14日	
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注　15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注　46時間	day1-2（持続）		