

VI. 婦人科領域がん

【卵巣がんレジメン】

★は内服薬

2021年7月現在

| レジメン名 | 薬剤 | 投与量 | 投与時間・用法 | 投与日 | 1コース期間 | 備考 |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|---|
| TC(Triweekly) | パクリタキセル | 175mg/m ² | 点滴静注 3時間 | day1 | 21日 | 6コース |
| | カルボプラチン | AUC=5 | 点滴静注 1時間 | day1 | | |
| TC(Weekly) | パクリタキセル | 80mg/m ² | 点滴静注 1時間 | day1,8,15 | 28日 | 6コース |
| | カルボプラチン | AUC=2 | 点滴静注 1時間 | day1,8,15 | | |
| DC | ドセタキセル | 70mg/m ² | 点滴静注 1時間 | day1 | 21日 | 6コース |
| | カルボプラチン | AUC=5 | 点滴静注 1時間 | day1 | | |
| DOC単剤 | ドセタキセル | 75mg/m ² | 点滴静注 1時間 | day1 | 21日 | 6コース |
| DP | ドセタキセル | 70mg/m ² | 点滴静注 1時間 | day1 | 21日 | 6コース |
| | シスプラチン | 60mg/m ² | 点滴静注 2時間 | day1 | | |
| CPT-P | イリノテカン 塩酸塩水和物 | 60mg/m ² | 点滴静注 2時間 | day1,8,15 | 28日 | 6コース |
| | シスプラチン | 60mg/m ² | 点滴静注 2時間 | day1 | | |
| CPT-11単剤 | イリノテカン 塩酸塩水和物 | 100mg/m ² | 点滴静注 90分 | day1,8,15 | 28日 | 6コース |
| CPT-11+oral VP-16 | イリノテカン 塩酸塩水和物 | 70mg/m ² | 点滴静注 90分 | day1,15 | 28日 | 6コース |
| | ★エトポシド | 50mg/m ² /day | 1日1回 寝る前 | day1-21 | | |
| PLD単剤 | リボソーム化 ドキシソルピシン塩酸塩 | 50mg/m ² | 点滴静注 90分 | day1 | 28日 | |
| GEM単剤 | ゲムシタピン | 1000mg/m ² | 点滴静注 30分 | day1,8 | 21日 | |
| GEM+CBDCA | ゲムシタピン | 1000mg/m ² | 点滴静注 30分 | day1,8 | 21日 | 10コース |
| | カルボプラチン | AUC=4 | 点滴静注 1時間 | day1 | | |
| EP | エトポシド | 100mg/m ² | 点滴静注 90分 | day1,2,3,4,5 | 21日 | 3~4コース |
| | シスプラチン | 20mg/m ² | 点滴静注 2時間 | day1,2,3,4,5 | | |
| Bmab+TC | パクリタキセル | 175mg/m ² | 点滴静注 3時間 | day1 | 21日 | 6コース |
| | カルボプラチン | AUC=6 | 点滴静注 1時間 | day1 | | |
| | ベバシズマブ | 15mg/kg | 点滴静注 30~90分 | day1 | | |
| Bmab+DC | ドセタキセル | 75mg/m ² | 点滴静注 1時間 | day1 | 21日 | 6コース |
| | カルボプラチン | AUC=6 | 点滴静注 1時間 | day1 | | |
| | ベバシズマブ | 15mg/kg | 点滴静注 30~90分 | day1 | | |
| Bmab単剤 | ベバシズマブ | 15mg/kg | 点滴静注 30~90分 | day1 | 21日 | Bmab+プラチン併用 化学療法施行後の 維持療法 |
| Bmab+オラパリブ | ベバシズマブ | 15mg/kg | 点滴静注 30~90分 | day1 | 21日 | Bmab+TC or DC 施行後の維持療法 導入療法と合わせて 最長15ヵ月/計22コース |
| | ★オラパリブ | 600mg/body/day | 1日2回 朝夕食後 | 連日 | | |
| Bmab+PLD | リボソーム化 ドキシソルピシン塩酸塩 | 40mg/m ² | 点滴静注 90分 | day1 | 28日 | |
| | ベバシズマブ | 15mg/kg | 点滴静注 30~90分 | day1 | | |
| BEP | ブレオマイシン塩酸塩 | 30mg/body | 点滴静注 30分 | day1,8,15 | 21日 | 3~4コース |
| | シスプラチン | 20mg/m ² | 点滴静注 2時間 | day1,2,3,4,5 | | |
| | エトポシド | 100mg/m ² | 点滴静注 90分 | day1,2,3,4,5 | | |
| dose-dense TC | パクリタキセル | 80mg/m ² | 点滴静注 1時間 | day1,8,15 | 21日 | 6~9コース |
| | カルボプラチン | AUC=6 | 点滴静注 1時間 | day1 | | |
| PLD-C | リボソーム化 ドキシソルピシン塩酸塩 | 30mg/m ² | 点滴静注 1時間 | day1 | 28日 | 6コース |
| | カルボプラチン | AUC=5 | 点滴静注 1時間 | day1 | | |
| PLD-C+Bmab | ベバシズマブ | 10mg/kg | 点滴静注 30~90分 | day1,15 | 28日 | 6コース |
| | リボソーム化 ドキシソルピシン塩酸塩 | 30mg/m ² | 点滴静注 1時間 | day1 | | |
| | カルボプラチン | AUC=5 | 点滴静注 1時間 | day1 | | |

VI. 婦人科領域がん

【子宮体がんレジメン】

★は内服薬

2020年4月現在

| レジメン名 | 薬剤 | 投与量 | 投与時間・用法 | 投与日 | 1コース期間 | 備考 |
|-------------|------------|----------------------|----------|-----------|--------|------|
| AP | ドキソルピシン塩酸塩 | 60mg/m ² | 点滴静注 10分 | day1 | 21日 | 6コース |
| | シスプラチン | 50mg/m ² | 点滴静注 2時間 | day1 | | |
| DP | ドセタキセル | 70mg/m ² | 点滴静注 1時間 | day1 | 21日 | 6コース |
| | シスプラチン | 60mg/m ² | 点滴静注 2時間 | day1 | | |
| TC | パクリタキセル | 180mg/m ² | 点滴静注 3時間 | day1 | 21日 | 6コース |
| | カルボプラチン | AUC=6 | 点滴静注 1時間 | day1 | | |
| PTX(Weekly) | パクリタキセル | 80mg/m ² | 点滴静注 1時間 | day1,8,15 | 28日 | |
| DOC単剤 | ドセタキセル | 70mg/m ² | 点滴静注 1時間 | day1 | 21日 | 6コース |

【子宮頸がんレジメン】

★は内服薬

2021年9月現在

| レジメン名 | 薬剤 | 投与量 | 投与時間・用法 | 投与日 | 1コース期間 | 備考 |
|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------------|--------|--|
| CDDP+Radiation | シスプラチン | 40mg/m ² | 点滴静注 90分 | day1,8,15, 22,29,36 | 42日 | 放射線と併用 1コース |
| PTX(Weekly) | パクリタキセル | 80mg/m ² | 点滴静注 1時間 | day1,8,15 | 28日 | |
| CPT-11単剤 | イリノテカン 塩酸塩水和物 | 100mg/m ² | 点滴静注 90分 | day1,8,15 | 28日 | 6コース |
| NDP+CPT-11 | イリノテカン 塩酸塩水和物 | 50mg/m ² | 点滴静注 90分 | day1,8,15 | 28日 | 4~5コース |
| | ネダプラチン | 80mg/m ² | 点滴静注 1時間 | day1 | | |
| TC | パクリタキセル | 175mg/m ² | 点滴静注 3時間 | day1 | 21日 | 6コース |
| | カルボプラチン | AUC=5 | 点滴静注 1時間 | day1 | | |
| TC+Bmab | パクリタキセル | 175mg/m ² | 点滴静注 3時間 | day1 | 21日 | TC療法が忍容できない 毒性が発現した場合は、 医師の判断により Bmab単剤での継続投 与可能 |
| | カルボプラチン | AUC=5 | 点滴静注 1時間 | day1 | | |
| | ベバシズマブ | 15mg/kg | 点滴静注 30~90分 | day1 | | |

【絨毛性疾患レジメン】

★は内服薬

2020年4月現在

| レジメン名 | 薬剤 | 投与量 | 投与時間・用法 | 投与日 | 1コース期間 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|---------|--------------|--------|----|
| MTX+LV救援 | メトレキサート | 1.0mg/kg | 筋注 | day1,3,5,7 | 18~21日 | |
| | ホリナート | 100μ g/kg | 筋注 | day2,4,6,8 | | |
| 5-day ACT-D | アクチノマイシンD | 0.01mg/kg | 点滴静注 6分 | day1,2,3,4,5 | 14日 | |

【子宮肉腫レジメン】

★は内服薬

2020年4月現在

| レジメン名 | 薬剤 | 投与量 | 投与時間・用法 | 投与日 | 1コース期間 | 備考 |
|-------|------------|-----------------------|----------|--------------|--------|-----------------|
| AI | ドキソルピシン塩酸塩 | 30mg/m ² | 点滴静注 15分 | day1 | 21日 | |
| | イホスファミド | 1500mg/m ² | 点滴静注 1時間 | day1,2,3,4,5 | | |
| DG | ゲムシタピン | 900mg/m ² | 点滴静注 30分 | day1,8 | 21日 | 術後補助の場合 6コース |
| | ドセタキセル | 70mg/m ² | 点滴静注 1時間 | day8 | | |