

I. 胃がん

★は内服薬

2022年12月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
DOC+S-1 (Triweekly)	ドセタキセル	40mg/m ²	点滴静注 1時間	day1	21日	
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m ² /day	1日2回 朝夕食後	day1-14		
DOC+S-1 (Biweekly)	ドセタキセル	35mg/m ²	点滴静注 1時間	day1,15	28日	
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m ² /day	1日2回 朝夕食後	day1-14		
PTX (Weekly)	パクリタキセル	60~80mg/m ²	点滴静注 1時間	day1,8,15	28日	
CDDP+S-1	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注 2時間	day8	35日	
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m ² /day	1日2回 朝夕食後	day1-21		
CPT-11+S-1 (5週1コース)	irinotecan 塩酸塩水和物	80mg/m ²	点滴静注 90分	day1,15	35日	
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m ² /day	1日2回 朝夕食後	day1-21		
CPT-11+S-1 (4週1コース)	irinotecan 塩酸塩水和物	75~100mg/m ²	点滴静注 90分	day1,15	28日	
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m ² /day	1日2回 朝夕食後	day1-14		
CDDP+CPT-11	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注 2時間	day1	28日	
	irinotecan 塩酸塩水和物	70mg/m ²	点滴静注 90分	day1,15		
XP	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注 2時間	day1	21日	
	★カペシタビン	2000mg/m ² /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		
トラスツズマブ+XP	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	
	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注 2時間	day1		
	★カペシタビン	2000mg/m ² /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		
nab-PTX (Triweekly)	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	260mg/m ²	点滴静注 30分	day1	21日	
トラスツズマブ+PTX	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	3週毎	-	
	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注 1時間	1週毎に3週連続 投与後、1週休薬		
XELOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 2時間	day1	21日	
	★カペシタビン	2000mg/m ² /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		
SOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 2時間	day1	21日	
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m ² /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		
トラスツズマブ+CDDP+S-1	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	
	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注 90分	day1		
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m ² /day	1日2回 朝夕食後	day1-14		
ラムシルマブ+PTX	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注 1時間	day1,15	28日	
	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注 1時間	day1,8,15		
ラムシルマブ単剤	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注 1時間	day1	14日	
CPT-11単剤	irinotecan 塩酸塩水和物	150mg/m ²	点滴静注 90分	day1	14日	
ニボルマブ単剤	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注 30分	day1	14日	
ラムシルマブ+nab-PTX	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注 1時間	day1,15	28日	
	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8,15		
トラスツズマブ+S-1	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m ² /day	1日2回 朝夕食後	day1-14		

I. 胃がん

★は内服薬

2022年12月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 2時間	day1	14日	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注 15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注 46時間	day1-2(持続)		
トラスツズマブ デルクステカン	トラスツズマブ デルクステカン	6.4mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	
ニボルマブ+SOX	ニボルマブ	360mg/body	点滴静注 30分	day1	21日	
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 2時間	day1		
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m ² /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		
ラムシルマブ+CPT-11	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注 1時間	day1	14日	
	イリノテカン 塩酸塩水和物	150mg/m ²	点滴静注 90分	day1		