

# I. 胃がん

★は内服薬

2026年7月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
DOC+S-1 (Triweekly)	ドセタキセル	40mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	day1	21日	
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1-14		
DOC+S-1 (Biweekly)	ドセタキセル	35mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	day1,15	28日	
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1-14		
PTX (Weekly)	パクリタキセル	60~80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	day1,8,15	28日	
CDDP+S-1	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day8	35日	
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1-21		
CPT-11+S-1 (5週1コース)	irinotecan 塩酸塩水和物	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1,15	35日	
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1-21		
CPT-11+S-1 (4週1コース)	irinotecan 塩酸塩水和物	75~100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1,15	28日	
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1-14		
CDDP+CPT-11	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1	28日	
	irinotecan 塩酸塩水和物	70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1,15		
XP	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1	21日	
	★カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		
トラスツズマブ+XP	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	
	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	★カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		
nab-PTX (Triweekly)	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	260mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	day1	21日	
トラスツズマブ+PTX	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	3週毎	-	
	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	1週毎に3週連続 投与後、1週休薬		
XELOX	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1	21日	
	★カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		
SOX	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1	21日	
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		
トラスツズマブ+CDDP+S-1	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	
	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1		
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1-14		
ラムシルマブ+PTX	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注 1時間	day1,15	28日	
	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	day1,8,15		
ラムシルマブ単剤	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注 1時間	day1	14日	
CPT-11単剤	irinotecan 塩酸塩水和物	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1	14日	
ニボルマブ単剤	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注 30分	day1	14日	
ラムシルマブ+nab-PTX	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注 1時間	day1,15	28日	
	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	day1,8,15		
トラスツズマブ+S-1	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1-14		

# I. 胃がん

★は内服薬

2026年7月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1	14日	
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1-2(持続)		
トラスツズマブ デルクスステカン	トラスツズマブ デルクスステカン	6.4mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	
ニボルマブ+SOX	ニボルマブ	360mg/body	点滴静注 30分	day1	21日	
	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		
	ラムシルマブ+CPT-11	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注 1時間		
ゾルベツキシマブ+XELOX	イリノテカン 塩酸塩水和物	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1	21日	
	ゾルベツキシマブ	初回:800mg/m <sup>2</sup> 2回目以降:600mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間以上かけて	day1		
	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
トラスツズマブ+SOX	★カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)	21日	
	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1		
	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		
ペムブロリズマブ+SOX	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30分	day1	21日	
	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		
	ペムブロリズマブ+XELOX	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30分		
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1			
★カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)			
ペムブロリズマブ+ トラスツズマブ+XELOX	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	
	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	★カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		
	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30分	day1		
ペムブロリズマブ+ トラスツズマブ+SOX	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	
	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1		
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		
	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30分	day1		
ペムブロリズマブ+ トラスツズマブ+FP	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	
	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	day1		
	フルオロウラシル	4000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 5日間	day1-5(持続)		
	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30分	day1		
トラスツズマブ+ mFOLFOX6	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1,22	42日	
	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1,15,29		
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	day1,15,29		
	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	day1,15,29		
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	day1-2(持続) day15-16(持続) day29-30(持続)		