

V. 肝細胞がん

★は内服薬

2023年3月現在

| レジメン名 | 薬剤 | 投与量 | 投与時間・用法 | 投与日 | 1コース期間 | 備考 |
|---------------------|-----------|---------------------------------------|----------------|---------------------------|--------|--|
| Low dose FP(集中動注) | シスプラチン | 20mg/body | 動注 30分 | day1 | 21日 | |
| | シスプラチン | 10mg/body | 動注 30分 | day2-5 day8-12 | | |
| | フルオロウラシル | 250mg/body | 動注 3時間 | day1-5 day8-12 | | |
| Low dose FP(維持動注) | シスプラチン | 20mg/body | 動注 30分 | day1 | 14日 | |
| | フルオロウラシル | 250mg/body | 動注 3時間 | day1 | | |
| EM(Child A) | エピルビシン塩酸塩 | 30mg/body | 動注 30分 | day1 | 14日 | |
| | マイトマイシンC | 8mg/body | 動注 30分 | day1 | | |
| EM(Child B) | エピルビシン塩酸塩 | 20mg/body | 動注 30分 | day1 | 14日 | |
| | マイトマイシンC | 6mg/body | 動注 30分 | day1 | | |
| EM(Child C) | エピルビシン塩酸塩 | 10mg/body | 動注 30分 | day1 | 14日 | |
| | マイトマイシンC | 4mg/body | 動注 30分 | day1 | | |
| FEM(集中動注 Child A) | エピルビシン塩酸塩 | 30mg/body | 動注 30分 | day1 | 7日 | |
| | マイトマイシンC | 8mg/body | 動注 30分 | day1 | | |
| | フルオロウラシル | 375mg/body | 動注 3時間 | day1-5 | | |
| FEM(集中動注 Child B) | エピルビシン塩酸塩 | 20mg/body | 動注 30分 | day1 | 7日 | |
| | マイトマイシンC | 6mg/body | 動注 30分 | day1 | | |
| | フルオロウラシル | 250mg/body | 動注 3時間 | day1-5 | | |
| FEM(集中動注 Child C) | エピルビシン塩酸塩 | 10mg/body | 動注 30分 | day1 | 7日 | |
| | マイトマイシンC | 4mg/body | 動注 30分 | day1 | | |
| | フルオロウラシル | 150mg/body | 動注 3時間 | day1-5 | | |
| FEM(維持動注 Child A) | エピルビシン塩酸塩 | 30mg/body | 動注 30分 | day1 | 14日 | |
| | マイトマイシンC | 8mg/body | 動注 30分 | day1 | | |
| | フルオロウラシル | 375mg/body | 動注 3時間 | day1 | | |
| FEM(維持動注 Child B) | エピルビシン塩酸塩 | 20mg/body | 動注 30分 | day1 | 14日 | |
| | マイトマイシンC | 6mg/body | 動注 30分 | day1 | | |
| | フルオロウラシル | 250mg/body | 動注 3時間 | day1 | | |
| FEM(維持動注 Child C) | エピルビシン塩酸塩 | 10mg/body | 動注 30分 | day1 | 14日 | |
| | マイトマイシンC | 4mg/body | 動注 30分 | day1 | | |
| | フルオロウラシル | 150mg/body | 動注 3時間 | day1 | | |
| NFP(集中動注) | 動注用シスプラチン | 50mg/body (適宜増減) | 動注 緩徐に | day1,8 | 21日 | |
| | フルオロウラシル | 250mg/body | 動注 ワンショット | day1,8 | | |
| | フルオロウラシル | 1250mg/body | 動注 5日間 | day1-5(持続) day8-12(持続) | | |
| NFP(維持動注) | 動注用シスプラチン | 10~50mg/body (適宜増減) | 動注 緩徐に | day1 | 14日 | 10コース |
| | フルオロウラシル | 250mg/body | 動注 ワンショット | day1 | | |
| | フルオロウラシル | 250~1000mg/body (適宜増減) | 動注 5日間 | day1-5(持続) | | |
| ラムシルマブ単剤 | ラムシルマブ | 8mg/kg | 点滴静注 1時間 | day1 | 14日 | |
| アテゾリズマブ+Bmab | アテゾリズマブ | 1200mg/body | 点滴静注 1時間 | day1 | 21日 | |
| | ベバシズマブ | 15mg/kg | 点滴静注 30~90分 | day1 | | |
| デュルバルマブ +トレメリムマブ | デュルバルマブ | 1500mg/body * 体重30kg以下は 20mg/kg | 点滴静注 1時間 | day1 | 28日 | 1コース終了後は デュルバルマブ 単剤にて 治療を行う 1コース |
| | トレメリムマブ | 300mg/body * 体重30kg以下は 4mg/kg | 点滴静注 1時間 | day1 | | |
| デュルバルマブ単剤 | デュルバルマブ | 1500mg/body * 体重30kg以下は 20mg/kg | 点滴静注 1時間 | day1 | 28日 | |