Ⅷ. その他

【食道がんレジメン】　★は内服薬　2021年3月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
CDDP+5-FU	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注　2時間	day1	21 or 28日	術前補助の場合 2コース
	フルオロウラシル	4000mg/㎡	点滴静注　5日間	day1-5（持続）		
DOC単剤	ドセタキセル	70mg/㎡	点滴静注　1時間	day1	21日	
FP+Radiation	シスプラチン	40mg/㎡	点滴静注　2時間	day1,8	35日	放射線と併用 2コース
	フルオロウラシル	2000mg/㎡	点滴静注　5日間	day1-5（持続） day8-12（持続）		
CDDP+VP-16（PE）	エトポシド	100mg/㎡	点滴静注　90分	day1,2,3	21日	4コース
	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
Low dose FP+Radiation	シスプラチン	6mg/㎡	点滴静注　1時間	day1,2,3,4,5 day8,9,10,11,12 day29,30,31,32,33 day36,37,38,39,40	56日	放射線と併用 1コース
	フルオロウラシル	300mg/㎡	点滴静注　22時間	day1,2,3,4,5 day8,9,10,11,12 day29,30,31,32,33 day36,37,38,39,40		
Low dose FP	シスプラチン	6mg/㎡	点滴静注　1時間	day1,2,3,4,5 day8,9,10,11,12	42日 or 70日	2～4コース
	フルオロウラシル	300mg/㎡	点滴静注　22時間	day1,2,3,4,5 day8,9,10,11,12		
NDP+5-FU	ネダプラチン	90mg/㎡	点滴静注　2時間	day1	28日	
	フルオロウラシル	4000mg/㎡	点滴静注　5日間	day1-5（持続）		
DCF（Biweekly）	ドセタキセル	30mg/㎡	点滴静注　1時間	day1,15	28日	
	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	フルオロウラシル	4000mg/㎡	点滴静注　5日間	day1-5（持続）		
ニボルマブ単剤(2weeks)	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注　30分	day1	14日	
ニボルマブ単剤(4weeks)	ニボルマブ	480mg/body	点滴静注　30分	day1	28日	

Ⅷ. その他

【胆道・膵臓がんレジメン】　★は内服薬　2023年2月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
GEM単剤	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注　30分	day1,8,15	28日	
GEM+S-1 （3週1コース）	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注　30分	day1,8 or day8,15	21日	
	★テガフール ギメラシル オテラシルカリウム	テガフールとして 80mg/㎡/day	1日2回　朝夕食後	day1-14		
GEM+S-1 （4週1コース）	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注　30分	day1,15	28日	
	★テガフール ギメラシル オテラシルカリウム	テガフールとして 80mg/㎡/day	1日2回　朝夕食後	day1-14		
GEM（動注）+S-1	ゲムシタビン	1000mg/body	動注　30分	day1,15	28日	膵臓がんのみ
	★テガフール ギメラシル オテラシルカリウム	テガフールとして 80mg/㎡/day	1日2回　朝夕食後	day1-14		
GEM+Radiation	ゲムシタビン	400mg/㎡	点滴静注　30分	day1,8,15, 29,36,43	56日	放射線と併用 1コース
CDDP+GEM	シスプラチン	25mg/㎡	点滴静注　1時間	day1,8	21日	胆道がんのみ
	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注　30分	day1,8		
GEM+エルロチニブ	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注　30分	day1,8,15	28日	膵臓がんのみ
	★エルロチニブ	100mg/body/day	1日1回　食事の 1時間以上前 又は食後2時間以降	連日		
nab-PTX+GEM	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	125mg/㎡	点滴静注　30分	day1,8,15	28日	膵臓がんのみ
	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注　30分	day1,8,15		
FOLFIRINOX	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注　2時間	day1	14日	膵臓がんのみ
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	イリノテカン 塩酸塩水和物	180mg/㎡	点滴静注　90分	day1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注　15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注　46時間	day1-2（持続）		
nal-IRI+5-FU/l-LV	ナノリポソーム型 イリノテカン	70mg/㎡	点滴静注　90分	day1	14日	膵臓がんのみ
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注　2時間	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注　46時間	day1-2（持続）		
デュルバルマブ+GC	デュルバルマブ	1500mg/body ＊体重30kg以下は 20mg/kg	点滴静注　1時間	day1	21日	胆道がんのみ 最大8コース
	シスプラチン	25mg/㎡	点滴静注　1時間	day1,8		
	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注　30分	day1,8		
デュルバルマブ単剤	デュルバルマブ	1500mg/body ＊体重30kg以下は 20mg/kg	点滴静注　1時間	day1	28日	胆道がんのみ デュルバルマブ+化学療法後の維持療法

Ⅷ. その他

【悪性軟部腫瘍レジメン】 ★は内服薬 2022年3月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
AI	ドキソルビシン塩酸塩	30mg/㎡	点滴静注 2時間	day1,2	21日	術前・術後補助の場合 術前:3コース 術後:2コース
	イホスファミド	2000mg/㎡	点滴静注 4時間	day1,2,3,4,5		
エリブリン単剤	エリブリンメシル酸塩	1.4mg/㎡	点滴静注 2～5分	day1,8	21日	
DXR単剤	ドキソルビシン塩酸塩	60mg/㎡	点滴静注 30分	day1	21日	
トラベクテジン単剤	トラベクテジン	1.2mg/㎡	点滴静注 24時間	day1	21日	

【頭頸部がんレジメン】 ★は内服薬 2024年5月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
TPF	ドセタキセル	60mg/㎡	点滴静注 2時間	day1	21日	3コース
	シスプラチン	60mg/㎡	点滴静注 2時間	day1		
	フルオロウラシル	700mg/㎡	点滴静注 24時間	day1,2,3,4		
CDDP+Radiation	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注 2時間	day1	21日	放射線と併用 3コース
ニボルマブ単剤	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注 30分	day1	14日	
ペムブロリズマブ単剤	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30分	day1	21日	
Weekly CDDP+Radiation	シスプラチン	30～40mg/㎡	点滴静注 2時間	day1	7日	放射線と併用 6～7コース

【神経内分泌細胞がんレジメン】 ★は内服薬 2020年4月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
CDDP+VP-16	エトポシド	100mg/㎡	点滴静注 90分	day1,2,3	21日	
	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注 2時間	day1		
CDDP+CPT-11	イリノテカン塩酸塩水和物	60mg/㎡	点滴静注 90分	day1,8,15	28日	
	シスプラチン	60mg/㎡	点滴静注 2時間	day1		
CBDCA+VP-16	エトポシド	80mg/㎡	点滴静注 90分	day1,2,3	21 or 28日	
	カルボプラチン	AUC＝5	点滴静注 1時間	day1		

【脳腫瘍レジメン】 ★は内服薬 2023年5月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
Bmab+TMZ	ベバシズマブ	10mg/kg	点滴静注 30～90分	day1,15	28日	
	★テモゾロミド	150mg/㎡/day	1日1回 空腹時	day1-5		
Bmab単剤	ベバシズマブ	10mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	14日	
Bmab+TMZ +Radiation	ベバシズマブ	10mg/kg	点滴静注 30～90分	day1,15,29,43	70日	放射線と併用 1コース
	★テモゾロミド	75mg/㎡/day	1日1回 空腹時	day1-42		
Bmab+TMZ （初発維持A期）	ベバシズマブ	10mg/kg	点滴静注 30～90分	day1,15	28日	Bmab+TMZ +Radiation療法 後の維持療法 6コース
	★テモゾロミド	150～200mg/㎡ /day	1日1回 空腹時	day1-5		
Bmab単剤 （初発維持B期）	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	21日	Bmab+TMZ +Radiation療法 後の維持療法

【悪性リンパ腫レジメン】 ★は内服薬 2022年9月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
R-MPV	リツキシマブ	375mg/㎡	点滴静注 初回50mg/hrより開始	day1	14日	5コース
	メトトレキサート	3500mg/㎡	点滴静注 3時間	day2		
	ビンクリスチン硫酸塩	1.4mg/㎡ （上限2mg/body）	点滴静注 5分	day2		
	★プロカルバジン塩酸塩	100mg/㎡/day	1日2～3回 食後	奇数コースの day2-8		
HD-AraC	シタラビン	3000mg/㎡	点滴静注 3時間	day1,2	28日	R-MPV，放射線の後治療 2コース

Ⅷ. その他

【MSI-High固形がんレジメン】 ★は内服薬 2020年4月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
ペムブロリズマブ単剤	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30分	day1	21日	

【悪性黒色腫レジメン】 ★は内服薬 2023年9月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
ニボルマブ単剤(2weeks)	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注 30分	day1	14日	術後補助の場合 12ヵ月間
ニボルマブ単剤(4weeks)	ニボルマブ	480mg/body	点滴静注 30分	day1	28日	術後補助の場合 12ヵ月間
ニボルマブ+イピリムマブ	ニボルマブ	80mg/body	点滴静注 30分	day1	21日	4コース
	イピリムマブ	3mg/kg	点滴静注 30分	day1		

【臨床試験レジメン】 ★は内服薬 2023年12月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
トラスツズマブ+SOX	トラスツズマブ	初回：8mg/kg 2回目以降：6mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	21日	胃がん 【院内臨床試験】
	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注 2時間	day1		
	★テガフール ギメラシル オテラシルカリウム	テガフールとして 80mg/㎡/day	1日2回 朝夕食後	day1（夕） −15（朝）		
Bmab+TFTD	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注 30～90分	day1	14日	大腸がん 【PRABITAS試験 B群】
	★トリフルリジン ・チピラシル塩酸塩	70mg/㎡/day	1日2回 朝夕食後	day1（夕）−6（朝）		