

VIII. その他

【食道がんレジメン】

★は内服薬

2021年3月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
CDDP+5-FU	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注 2時間	day1	21 or 28日	術前補助の場合 2コース
	フルオロウラシル	4000mg/m ²	点滴静注 5日間	day1-5(持続)		
DOC単剤	ドセタキセル	70mg/m ²	点滴静注 1時間	day1	21日	
FP+Radiation	シスプラチン	40mg/m ²	点滴静注 2時間	day1,8	35日	放射線と併用 2コース
	フルオロウラシル	2000mg/m ²	点滴静注 5日間	day1-5(持続) day8-12(持続)		
CDDP+VP-16(PE)	エトポシド	100mg/m ²	点滴静注 90分	day1,2,3	21日	4コース
	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注 2時間	day1		
Low dose FP+Radiation	シスプラチン	6mg/m ²	点滴静注 1時間	day1,2,3,4,5 day8,9,10,11,12 day29,30,31,32,33 day36,37,38,39,40	56日	放射線と併用 1コース
	フルオロウラシル	300mg/m ²	点滴静注 22時間	day1,2,3,4,5 day8,9,10,11,12 day29,30,31,32,33 day36,37,38,39,40		
Low dose FP	シスプラチン	6mg/m ²	点滴静注 1時間	day1,2,3,4,5 day8,9,10,11,12	42日 or 70日	2~4コース
	フルオロウラシル	300mg/m ²	点滴静注 22時間	day1,2,3,4,5 day8,9,10,11,12		
NDP+5-FU	ネダプラチン	90mg/m ²	点滴静注 2時間	day1	28日	
	フルオロウラシル	4000mg/m ²	点滴静注 5日間	day1-5(持続)		
DCF(Biweekly)	ドセタキセル	30mg/m ²	点滴静注 1時間	day1,15	28日	
	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注 2時間	day1		
	フルオロウラシル	4000mg/m ²	点滴静注 5日間	day1-5(持続)		
ニボルマブ単剤(2weeks)	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注 30分	day1	14日	
ニボルマブ単剤(4weeks)	ニボルマブ	480mg/body	点滴静注 30分	day1	28日	

VIII. その他

【胆道・膵臓がんレジメン】

★は内服薬

2023年2月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
GEM単剤	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8,15	28日	
GEM+S-1 (3週1コース)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8 or day8,15	21日	
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m ² /day	1日2回 朝夕食後	day1-14		
GEM+S-1 (4週1コース)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分	day1,15	28日	
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m ² /day	1日2回 朝夕食後	day1-14		
GEM(動注)+S-1	ゲムシタビン	1000mg/body	動注 30分	day1,15	28日	膵臓がんのみ
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m ² /day	1日2回 朝夕食後	day1-14		
GEM+Radiation	ゲムシタビン	400mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8,15, 29,36,43	56日	放射線と併用 1コース
CDDP+GEM	シスプラチン	25mg/m ²	点滴静注 1時間	day1,8	21日	胆道がんのみ
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8		
GEM+エルロチニブ	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8,15	28日	膵臓がんのみ
	★エルロチニブ	100mg/body/day	1日1回 食事の 1時間以上前 又は食後2時間以降	連日		
nab-PTX+GEM	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	125mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8,15	28日	膵臓がんのみ
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8,15		
FOLFIRINOX	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 2時間	day1	14日	膵臓がんのみ
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 2時間	day1		
	イリノテカン 塩酸塩水和物	180mg/m ²	点滴静注 90分	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注 15分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注 46時間	day1-2(持続)		
nal-IRI+5-FU/I-LV	ナリリボソーム型 イリノテカン	70mg/m ²	点滴静注 90分	day1	14日	膵臓がんのみ
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 2時間	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注 46時間	day1-2(持続)		
デュルバルマブ+GC	デュルバルマブ	1500mg/body * 体重30kg以下は 20mg/kg	点滴静注 1時間	day1	21日	胆道がんのみ 最大8コース
	シスプラチン	25mg/m ²	点滴静注 1時間	day1,8		
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8		
デュルバルマブ単剤	デュルバルマブ	1500mg/body * 体重30kg以下は 20mg/kg	点滴静注 1時間	day1	28日	胆道がんのみ デュルバルマブ+化学 療法後の維持療法

VIII. その他

【悪性軟部腫瘍レジメン】

★は内服薬

2022年3月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
AI	ドキソルビン塩酸塩	30mg/m ²	点滴静注 2時間	day1,2	21日	術前・術後補助の場合 術前:3コース 術後:2コース
	イホスファミド	2000mg/m ²	点滴静注 4時間	day1,2,3,4,5		
エリブリン単剤	エリブリンメシル酸塩	1.4mg/m ²	点滴静注 2~5分	day1,8	21日	
DXR単剤	ドキソルビン塩酸塩	60mg/m ²	点滴静注 30分	day1	21日	
トラベクテジン単剤	トラベクテジン	1.2mg/m ²	点滴静注 24時間	day1	21日	

【頭頸部がんレジメン】

★は内服薬

2022年11月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
TPF	ドセタキセル	60mg/m ²	点滴静注 2時間	day1	21日	3コース
	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注 2時間	day1		
	フルオロウラシル	700mg/m ²	点滴静注 24時間	day1,2,3,4		
CDDP+Radiation	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注 2時間	day1	21日	放射線と併用 3コース
ニボルマブ単剤	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注 30分	day1	14日	
ペムブロリズマブ単剤	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30分	day1	21日	

【神経内分泌細胞がんレジメン】

★は内服薬

2020年4月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
CDDP+VP-16	エトポシド	100mg/m ²	点滴静注 90分	day1,2,3	21日	
	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注 2時間	day1		
CDDP+CPT-11	イリノテカン 塩酸塩水和物	60mg/m ²	点滴静注 90分	day1,8,15	28日	
	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注 2時間	day1		
CBDCA+VP-16	エトポシド	80mg/m ²	点滴静注 90分	day1,2,3	21 or 28日	
	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注 1時間	day1		

【脳腫瘍レジメン】

★は内服薬

2020年6月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
Bmab+TMZ	ベバシズマブ	10mg/kg	点滴静注 30~90分	day1,15	28日	
	★テモゾロミド	150mg/m ² /day	1日1回 空腹時	day1-5		
Bmab単剤	ベバシズマブ	10mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	14日	

【悪性リンパ腫レジメン】

★は内服薬

2022年9月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
R-MPV	リツキシマブ	375mg/m ²	点滴静注 初回50mg/hrより開始	day1	14日	5コース
	メトレキサート	3500mg/m ²	点滴静注 3時間	day2		
	ビンクリスチン 硫酸塩	1.4mg/m ² (上限2mg/body)	点滴静注 5分	day2		
	★プロカルバジン 塩酸塩	100mg/m ² /day	1日2~3回 食後	奇数コースの day2-8		
HD-AraC	シタラビン	3000mg/m ²	点滴静注 3時間	day1,2	28日	R-MPV, 放射線の 後治療 2コース

VIII. その他

【MSI-High固形がんレジメン】

★は内服薬

2020年4月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
ペムブロリズマブ単剤	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30分	day1	21日	

【悪性黒色腫レジメン】

★は内服薬

2022年7月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
ニボルマブ単剤(2weeks)	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注 30分	day1	14日	術後補助の場合 12ヵ月間
ニボルマブ単剤(4weeks)	ニボルマブ	480mg/body	点滴静注 30分	day1	28日	術後補助の場合 12ヵ月間

【臨床試験レジメン】

★は内服薬

2020年5月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
トラスツズマブ+SOX	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	胃がん 【院内臨床試験】
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 2時間	day1		
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m ² /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		